

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤΟΧΟΣ - ΔΟΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

ΜΗΛΙΑ, ΑΧΛΑΔΙΑ, ΚΥΔΩΝΙΑ: Βακτηριακό κάψιμο, με δόση: 75 κ.εκ. σκ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού (max 75 κ.εκ. σκ./ στρ.) με όγκο ψεκ. υγρού 100 لتر./ στρ.(max), από το στάδιο της πράσινης κορυφής μέχρι την πτώση των πετάλων.

ΜΗΛΙΑ: Φουζικλάδιο, με δόση: 100 κ.εκ. σκ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού (max 100 κ.εκ. σκ./ στρ.) με όγκο ψεκ. υγρού 100 لتر./ στρ.(max), από την ανάπτυξη των πρώτων φύλλων ως την πλήρη ωρίμανση των καρπών.

ΑΜΠΕΛΙ: Ωίδιο, με δόση: 200 κ.εκ. σκ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού (max 200 κ.εκ. σκ./ στρ.) με όγκο ψεκ. υγρού 100 لتر./ στρ.(max), από την ανάπτυξη των πρώτων φύλλων ως τη συγκομιδή.

ΦΡΑΟΥΛΑ (Y+Θ): Ωίδιο, με δόση: 75 κ.εκ. σκ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού (max 75 κ.εκ. σκ./ στρ.) με όγκο ψεκ. υγρού 100 لتر./ στρ.(max), από την εμφάνιση του δευτέρου φύλλου ως και την εμφάνιση νέων φύλλων, μετά τη συγκομιδή.

ΤΟΜΑΤΑ (Y+Θ): Για Βακτηριακή στιγμάτωση, Τεφρά σήψη με δόση: 200 κ.εκ. σκ./ στρ. (max), με όγκο ψεκ. υγρού: 50 لتر./ στρ.(max), από την έναρξη ανάπτυξης των φύλλων ως την πλήρη ωρίμανση των καρπών.

ΤΟΜΑΤΑ (Y+Θ): Για Ωίδιο με δόση: 100 κ.εκ. σκ./ στρ.(max), με όγκο ψεκ. υγρού: 50 لتر./ στρ.(max), από την έναρξη ανάπτυξης των φύλλων ως την πλήρη ωρίμανση των καρπών.

ΜΑΡΟΥΛΙ (Y+Θ): Περονόσπορος, με δόση: 250 κ.εκ. σκ./ στρ.(max), με όγκο ψεκ. υγρού 50-100 لتر./ στρ.(max), από την εμφάνιση του τρίτου πραγματικού φύλλου ώσπου η κεφαλή να αποκτήσει το τυπικό της μέγεθος και σχήμα.

ΑΚΤΙΝΙΔΙΟ¹ (χρήση ήσσονος σημασίας), για Βακτηριακό έλκος, με δόση: 200 κ.εκ./ στρ. (max), με όγκο ψεκ. υγρού 70-100 لتر./ στρ.(max), από την ανάπτυξη του φυλλώματος ως τη συγκομιδή.

Παρατηρήσεις:

¹ Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στην καλλιέργεια του ακτινιδίου από τη χρήση του σκευάσματος. Για τη χρήση του σκευάσματος στην καλλιέργεια αυτή ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο (επαν./ ημέρες): ΜΗΛΙΑ, ΑΧΛΑΔΙΑ, ΚΥΔΩΝΙΑ: Βακτηριακό κάψιμο 7/10 ημέρες. ΜΗΛΙΑ: Φουζικλάδιο 20/7 ημέρες. ΑΜΠΕΛΙ: Ωίδιο 10/10 ημέρες. ΦΡΑΟΥΛΑ (Y+Θ): Ωίδιο 7/10 ημέρες. ΤΟΜΑΤΑ (Y+Θ): Ωίδιο, Βακτηριακή στιγμάτωση, Τεφρά σήψη, 7/7-10 ημέρες. ΜΑΡΟΥΛΙ (Y+Θ): Περονόσπορος 7/7-10 ημέρες., ΑΚΤΙΝΙΔΙΟ: Βακτηριακό έλκος 7/10-14.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή (σε ημέρες):

Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά, Αμπέλι (Επιτραπέζια σταφύλια), Αμπέλι (Οινοποιήσιμα σταφύλια), Φράουλα (Y+Θ), Τομάτα (Y+Θ), Μαρούλι (Y+Θ), Ακτινίδιο: --

Συνδυαστικότητα: -

VACCIPLANT SL (Laminarin 4,5% B/o)

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ
ΑΜΥΝΑΣ ΦΥΤΩΝ



UFI: Y2W6-9UCV-FM2J-74FY

ΠΡΟΣΟΧΗ

Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ. Πλυθείτε σχολαστικά μετά το χειρισμό. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο. Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας, γάντια και γυαλιά κατά την ανάμιξη, φόρτωση και εφαρμογή του σκευάσματος. Φοράτε μακρυμάνικο πουκάμισο και μακρό παντελόνι σε περίπτωση επανεισόδου μετά τον ψεκασμό. Διάθεση του περιεχομένου/ περιεκτική σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους. Επιτρέπεται η χρήση του σε υδροπονικές θερμοκηπιακές καλλιέργειες μόνο όταν διαθέτουν σύστημα καθαρισμού του νερού σε ποσοστό 95%.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Αρ. Άδειας Διάθεσης στην Αγορά:
11105/ 30.07.2009

Εγγυημένη σύνθεση: Δραστική ουσία:
Laminarin 4,5% B/o,
Βοηθητικές ουσίες: 25% B/B

ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ (SL)

Το φυτοπροστατευτικό προϊόν VACCIPLANT δρα ως ενεργοποιητής των μηχανισμών άμυνας των φυτών, χωρίς να είναι μυκητοκτόνο ή βακτηριοκτόνο. Δρα ενισχύοντας την αντίσταση του φυτού ενάντια στο βακτηριακό κάψιμο, το ωίδιο, τον βοτρυτή, το φουζικλάδιο και τον περονόσπορο, μειώνοντας έτσι τις βλαβερές επιπτώσεις τους στα καλλιέργειες.

Κάτοχος της άδειας:
Laboratoires GOËMAR S.A.S
Parc Technopolitain Atalante,
CS 41908, 35435 Saint Malo,
Cedex, Γαλλία

Υπεύθυνος για την τελική
διάθεση στην αγορά:
UPL Ελλάς Α.Ε.,
Ριζαρείου 16, Χαλάνδρι,
Τ.Κ.: 15233, Τηλ.: 210 5578777,
e-mail: info.hellas@upl-td.com

Αριθ. Παρτίδας/
Ημερ. Παραγωγής:
Βλέπε συσκευασία

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού:

ΑΝΑΚΙΝΗΣΤΕ ΚΑΛΑ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ. Γεμίστε το ψεκαστικό δοχείο μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα προϊόντος, αναδεύοντας. Συμπληρώστε στη συνέχεια με το απαιτούμενο νερό με συνεχή ανάδευση. Εφαρμόστε το αμέσως μετά την παρασκευή του διαλύματος.

Καθαρισμός ψεκαστήρα:

Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό μέχρι να εξαφανιστούν πλήρως όλα τα ίχνη του προϊόντος.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Οι φιάλες και τα δοχεία ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Αιχμείωση ανθεκτικότητας: Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική ουσία laminarin, ενεργοποιητή της άμυνας των φυτών που ανήκει στην ομάδα P04 κατά FRAC. Το VACCIPLANT εφαρμόζεται προληπτικά και εφόσον οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη των ασθενειών. Εάν εμφανισθούν συμπτώματα των ασθενειών ή αναμένονται ισχυρές προσβολές, ψεκάστε με κατάλληλα μυκητοκτόνα.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:

Μην εισέρχεστε στην ψεκασμένη περιοχή πριν στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό υγρό στη φυλλική επιφάνεια.

Φυτοτοξικότητα:

Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα του, στις ελληνικές εδαφοκλιματολογικές συνθήκες.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:

Διατηρείται στην αρχική του συσκευασία, καλά κλειστό, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής του.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε γιατρό. Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο, ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777

Περιεχόμενο: 1L

