

GRAMEN

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Μεταλλικός χαλκός (Cu) 20% β/β, (σε μορφή βορδιγάλειου πολτού)

ΜΟΡΦΗ Βρέξιμοι κόκκοι (WG)

ΑΡ. ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦ. 8813/214752/ 30.08.2019 Άδεια Παράλληλου Εμπορίου

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΣ  

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 1Kg, 5Kg, 10Kg, 15Kg, 20Kg

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ GRAMEN ΣΤΟΝ ΨΕΚΑΣΜΟ

 Ουδέτερο pH = 7 που εξασφαλίζει μεγάλο εύρος συνδυαστικότητας

 Δε δημιουργείται αφρός κατά την ανάδευση με άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα στο ίδιο βυτίο

 Αποφυγή φραξίματος ακροφυσίων των ψεκαστήρων λόγω πλήρους διάλυσης του προϊόντος και αποφυγής δημιουργίας σκόνης

 Εύκολη και γρήγορη ανάδευση



Ημερομηνία Έκδοσης: Σεπτέμβριος 2021

Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάσετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα. Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777



UPL ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Ριζαρείου 16, Χαλάνδρι - Τ.Κ. 152 33

Τ: 210 55 78 777

www.upl-ltd.com/gr



Οι πληροφορίες στο παρόν φυλλάδιο δεν αποτελούν σύσταση παρά μόνο οδηγίες για την ορθή χρήση των προϊόντων. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στον επίσημο ιστότοπο μας www.upl-ltd.com/gr. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην UPL και σε άλλους κατασκευαστές και ενδέχεται να υποκείνται σε προστασία πνευματικών δικαιωμάτων. Διαβάστε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες των προϊόντων πριν από τη χρήση τους. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τη UPL Ελλάς.

GRAMEN

 ISPERSS

ΒΡΕΞΙΜΟΙ ΚΟΚΚΟΙ (WG) ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ

200 g/Kg ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΧΑΛΚΟΥ (ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΒΟΡΔΙΓΑΛΕΙΟΥ ΠΟΛΤΟΥ)

Συσκευασίες:

1Kg, 5Kg, 10Kg, 15Kg & 20Kg


ΧΑΛΚΟΥΧΟ ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΑ ΧΑΛΚΟΥΧΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

- Άριστη κάλυψη της φυλλικής επιφάνειας για μέγιστη προστασία
- Ομοιόμορφη και γρήγορη διάλυση στο βυτίο λόγω της εξαιρετικής διαλυτότητας των κόκκων
- Μεγάλη διάρκεια δράσης και μείωση του κινδύνου φυτοτοξικότητας λόγω της σταθερής και ελεγχόμενης απελευθέρωσης ιόντων χαλκού
- Υψηλή αντοχή στην έκπλυση απο βροχή

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε μας στο:


www.upl-ltd.com/gr



DISPERSS technology

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ

Το GRAMEN με τεχνολογία DISPERSS αποτελείται αποκλειστικά απο βροχαντίτη (μορφή κρυστάλλων άλατος θειικού χαλκού, με μέγεθος κόκκων 1,5μm), ως πηγή βιοδιαθέσιμων ιόντων χαλκού Cu⁺⁺. Η τεχνολογία DISPERSS συμβάλλει στη σταθερή και συνεχή απελευθέρωση των ιόντων χαλκού, που εμπεριέχονται στον βροχαντίτη, διαδικασία η οποία εγγυάται την εκλεκτικότητα του GRAMEN σε κάθε στάδιο ανάπτυξης της καλλιέργειας. Πρακτικά, επιτυγχάνεται η μέγιστη αποτελεσματικότητα του ψεκαζόμενου χαλκού, με αποτέλεσμα να απαιτούνται μικρότερες δόσεις εφαρμογής.



Η αργή και σταδιακή απελευθέρωση μικρών αλλά επαρκών ποσοτήτων χαλκού, εξασφαλίζει:

- Μέγιστη αποτελεσματικότητα
- Δράση μακράς διάρκειας
- Μείωση κινδύνου φυτοτοξικότητας
- Υψηλή υπολειμματική προστασία



GRAMEN

Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΑ ΧΑΛΚΟΥΧΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Το GRAMEN είναι ανόργανο μυκητοκτόνο που περιέχει 20% β/β μεταλλικό χαλκό (Cu), σε μορφή βορδιγάλειου πολτού (WG). Παρασκευάζεται με την πρωτοποριακή τεχνολογία διασπειρόμενων κόκκων DISPERSS, εξασφαλίζοντας υψηλή προστασία και μακράς διάρκειας δράση έναντι των ασθενειών.

Καλλιέργεια	Στόχος	Δόσεις γραμ / στρέμμα	Χρόνος Εφαρμογής
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ	Κορυφοξήρα Προσβολή κλαδίσκων, φύλλων, καρπών	1.000	Προληπτικές εφαρμογές φθινοπώρου εφόσον οι καιρικές συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας. Εφαρμογή μετά από χαλάζι ή παγετό.
ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ	Κορύνεο	400-480	Μία εφαρμογή το φθινόπωρο όταν έχει πέσει το 75% των φύλλων και μια το χειμώνα λίγο πριν την έκπτυξη των ξυλοφόρων οφθαλμών. Με την έναρξη της βλάστησης γίνονται άλλες 1-2 εφαρμογές εφ' όσον υπάρχει σοβαρό πρόβλημα.
ΚΑΡΥΔΙΑ	Ανθράκνωση	400-480	Συνιστώνται 3-4 εφαρμογές που αρχίζουν πριν βγουν τα φύλλα και επαναλαμβάνονται κάθε 10 ημέρες. Να αποφεύγονται οι εφαρμογές στην άνθηση.
ΜΗΛΙΑ	Φουζικλάδιο	550-937,5	Εφόσον δεν εφαρμόζεται πρόγραμμα γεωργικών προειδοποιήσεων συνιστώνται εφαρμογές στα στάδια της πράσινης και ρόδινης κορυφής και εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας.
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ	Εξώασκος Κορύνεο Φαϊά σήψη	425-500	Προληπτικές εφαρμογές το φθινόπωρο μόλις πέσουν τα φύλλα και στο τέλος του χειμώνα πριν φουσκώσουν τα μάρτια.
ΑΜΠΕΛΙ	Περονόσπορος Ανθράκνωση	275-440	Εφόσον δεν εφαρμόζεται πρόγραμμα γεωργικών προειδοποιήσεων προληπτικές εφαρμογές που αρχίζουν την άνοιξη όταν υπάρχουν οι κατάλληλες για την προσβολή συνθήκες και συνεχίζονται ανάλογα με την εξέλιξη των τοπικών συνθηκών.
ΕΛΙΑ	Κυκλοκόνιο Γλοισπόριο Καρκίνωση	900	Δύο εφαρμογές: η 1 ^η εφαρμογή το φθινόπωρο λίγο πριν την έναρξη των βροχών και η 2 ^η την άνοιξη όταν τα νέα φύλλα αποκτήσουν μήκος 2 εκ. Δύο εφαρμογές: η 1 ^η όταν αρχίζουν να ωριμάζουν οι καρποί και η 2 ^η 20 ημέρες αργότερα. Μετά από χαλάζι ή παγετό
ΠΑΤΑΤΑ	Περονόσπορος	275-490 (βαριά προσβολή) 175-275 (ελαφρά προσβολή)	Εφόσον οι καιρικές συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας οι εφαρμογές ξεκινούν όταν τα φυτά έχουν ύψος 15-20 εκ. και επαναλαμβάνονται ανάλογα με την ένταση της προσβολής.
ΤΟΜΑΤΑ (Υ+Θ)	Περονόσπορος Βακτηριακή κηλίδωση	275-440	Προληπτικές εφαρμογές εφόσον οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας. Εφαρμογές με την εκδήλωση της ασθένειας και εφόσον υπάρχουν ευνοϊκές συνθήκες για την εξαπλώσή της.
ΛΑΧΑΝΙΚΑ	Περονόσπορος Σεπτορίωση Ανθράκνωση Βακτηριώσεις	175-275	Εφαρμογές που αρχίζουν από το στάδιο των νεαρών σπορόφυτων και συνεχίζονται κάθε 7-14 ημέρες. Εφαρμογές που αρχίζουν στα νεαρά φυτά. Εφαρμογές που αρχίζουν στο στάδιο των σπορόφυτων και σταματούν στην καρπώδη.
ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ	Κερκοσπορίωση	250-275	Εφαρμογές που αρχίζουν με την πρώτη εμφάνιση των συμπτωμάτων της ασθένειας.
ΚΑΛΩΠΙΣΤΙΚΑ	Περονόσπορος Σεπτορίωση Φυτόφθορα	275-440	Εφαρμογές που αρχίζουν με την εκδήλωση των πρώτων συμπτωμάτων. Εφαρμογή στα νεαρά φυτά στο σπορείο ή μετά τη μεταφύτευση.