

OLEORA®

(Orange oil: 60% β/ο)

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ - ΑΚΑΡΕΟΚΤΟΝΟ

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ):
14842/26.10.2023

Υγρό γαλακτωματοποιήσιμο (EC)

Εγγυημένη σύνθεση: Δραστική ουσία:
Orange oil: 60% β/ο,
Βοηθητικές ουσίες: 33,11% β/β

Εντομοκτόνο-ακαρεοκτόνο επαφής με φυσικό τρόπο δράσης. Διαβρέχει και διασπά τα εξωτερικά προστατευτικά στρώματα του εξωσκελετού των εντόμων και των ακάρεων, επιτρέποντας στο δραστικό συστατικό να διεισδύσει στα ζωντανά κύτταρα του εσωτερικού προστατευτικού στρώματος. Η απώλεια της λειτουργικότητας των προστατευτικών στρωμάτων εκθέτει τους συγκεκριμένους οργανισμούς στην απώλεια υγρών, οδηγώντας μέσω αφυδάτωσης στο θάνατό τους.

Κάτοχος της άδειας: Arysta LifeScience Benelux Srl
Rue de Renory 26/1, 4102 Ougrée, Βέλγιο

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:
UPL Ελλάς Α.Ε.,
Ριζαρείου 16, Καλάνδρι, Τ.Κ.: 15233,
Τηλ.: 210 5578777

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού:
Καθορίστε την ποσότητα νερού που θα χρησιμοποιήσετε στον ψεκασμό σας. Γεμίστε το ψεκαστικό δοχείο με τη μισή ποσότητα νερού. Προσθέστε την απαιτούμενη δόση του σκευάσματος υπό συνεχή ανάδευση. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς.

Καθαρισμός ψεκαστήρα: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού μέχρι να εξαφανιστούν πλήρως όλα τα ίχνη του προϊόντος.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Οι φιάλες ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Αποθηκεύεται στην αρχική απαράβιαστη συσκευασία του και σε μέρος ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο, προστατευμένο από παγετό. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για 2 χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ



1 L
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ



ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ: Πεδίο Εφαρμογής - Στόχος - Δόσεις σκευάσματος- Τρόπος και χρόνος εφαρμογής - Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ, ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ, ΛΕΜΟΝΙΑ, ΓΚΡΕΪΦ-ΦΡΟΥΤ, ΦΡΑΠΑ: Για Κόκκινο τετράνυχο, Κίτρινο τετράνυχο, Καφέ τετράνυχο με δόση 100-200 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (200 κ.εκ./στρέμμα (max)) και όγκο ψεκ. υγρού 100-200⁽¹⁾ λίτρα/στρέμμα. Δύο (2) εφαρμογές από την έναρξη της καρπόδεσης έως την έναρξη του χρωματισμού των καρπών (BBCH 71-81) με μεσοδιάστημα εφαρμογών 7 ημέρες.

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ, ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ, ΛΕΜΟΝΙΑ, ΓΚΡΕΪΦ-ΦΡΟΥΤ, ΦΡΑΠΑ: Για Κόκκινη ψύρα των εσπεριδοειδών, με δόση 100-200 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (200 κ.εκ./στρέμμα (max)) και όγκο ψεκ. υγρού 100-200⁽¹⁾ λίτρα/στρέμμα. Δύο (2) εφαρμογές από την έναρξη της καρπόδεσης έως την έναρξη του χρωματισμού των καρπών (BBCH 71-81)⁽²⁾ με μεσοδιάστημα εφαρμογών 10 ημέρες.

Παρατηρήσεις: 1. Για να επιτευχθεί η σωστή συγκέντρωση προϊόντος, η δόση ανά στρέμμα πρέπει να προσαρμόζεται με τον χρησιμοποιούμενο όγκο νερού, ο οποίος καθορίζεται ανάλογα με τη φυλλική επιφάνεια/ανάπτυξη των δέντρων. Η δόση θα κυμαίνεται μεταξύ 100-200 κ.εκ. σκευάσματος/στρ. ανά εφαρμογή. 2. Για την ψύρα, οι εφαρμογές μπορούν να πραγματοποιηθούν με δύο τρόπους:
- δύο εφαρμογές στη δεύτερη γενιά (Αύγουστος) ή
- πρώτη εφαρμογή στην πρώτη γενιά (Ιούνιος-Ιούλιος) και δεύτερη εφαρμογή στη δεύτερη γενιά (Αύγουστος).



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Υγρό και ατμοί εύφλεκτα. Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς. Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. Περιέχει isotridecanoethoxylate και dodecylbenzene sulphonic acid, compound with 2,2',2''-nitri-

UFI: NKRE-349E-9SKQ-5SHE

Iotriethanol. Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Μακριά από θερμότητα/σπινθήρες/γυμνές φλόγες/θερμές επιφάνειες. Μην καπνίζετε. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. «Φοράτε μακρυμάνικο πουκάμισο και μακρού παντελόνι και γάντια κατά την ανάμιξη/ φόρτωση και την εφαρμογή». «Φοράτε μακρυμάνικο πουκάμισο και μακρού παντελόνι σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό». Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Η ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ. Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθωστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΗΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:** Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ:** Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ρούχα που έχουν έρθει σε επαφή με το προϊόν. Πλυθείτε καλά με άφθονο νερό. Εάν ο δερματικός ερεθισμός παραμείνει, καλέστε γιατρό. Πλύνετε καλά τα ρούχα πριν τα ξαναφορέσετε. Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός ή ερυθρότητα ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. **Αντιδοτό:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία. **ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777**

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μετά-εφαρμογής και -της πρόσβασης του αναθροπού ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Μην εισέρχεστε στην ψεκασμένη περιοχή πριν στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό υγρό.

Φυτοτοξικότητα: Το προϊόν δεν είναι φυτοτοξικό εφόσον χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις: Εσπεριδοειδή: Μη εφαρμοσίμο.

Συνδυαστικότητα: --